

ABAMECTINA



USO VETERINÁRIO - ANTIPARASITÁRIO
INJETÁVEL PARA BOVINOS
ABAMECTINA 1%

"ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:"
BOVINOS
"ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO "35" DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO"
"LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO"

"A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULÃO PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO"

FÓRMULA

Cada 100 ml contém:

Abamectina 1,00 g
Veículo q.s.p. 100,00 ml

INDICAÇÕES

ABAMECTINA 1% MATSUDA é indicada no tratamento e controle de verminoses gastrointestinais e pulmonares que acometem os bovinos, assim como, das ectoparasitoses causadas por bernês, piolhos e sarnas.

ABAMECTINA 1% MATSUDA também é indicada para auxiliar no controle do carrapato dos bovinos e na prevenção do aparecimento de bicheiras nas feridas decorrentes da castração e descorna.

ABAMECTINA 1% MATSUDA é, principalmente, indicada no tratamento e controle de:

- **Vermes redondos gastrointestinais** (fases adultas e larvares): *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axei*, *Ostertagia ostertagi*, *Cooperia spp.*, *Nematodirus helvetianus*, *Bunostomum phlebotomum*, *Chabertia ovina* e *Oesophagostomum radiatum* (fase adulta);
- **Vermes pulmonares:** *Dictyocaulus viviparus*;
- **Larvas de moscas:** Berne (*Dermatobia hominis*), Miíases (*Cochliomya hominivorax*);
- **Sarnas:** *Sarcoptes scabiei var. bovis*, *Chorioptes bovis*;
- **Piolhos:** *Linognathus vituli*, *Haematopinus euryternus*, *Damalinea bovis*, *Solenoptes capillatus*.

ABAMECTINA 1% MATSUDA atua na prevenção do desenvolvimento de bicheiras nas feridas decorrentes das intervenções cirúrgicas de castração e descorna dos bovinos, não sendo, entretanto, dispensada a observação diária.

Quando a bicheira já estiver instalada, usar produtos larvicidas específicos.

ABAMECTINA 1% MATSUDA auxilia no controle do carrapato bovino (*Boophilus microplus*), quando utilizado como parte de um programa de controle.

MODO DE USAR

ABAMECTINA 1% MATSUDA deve ser aplicada pela via subcutânea, preferencialmente na frente ou atrás da paleta. Utilizar equipamento estéril e obedecer às normas de assepsia.

POSOLOGIA

A dosagem indicada para bovinos é de 1ml para cada 50kg de peso corporal (conforme tabela abaixo) equivalente a 200 µg de abamectina por kg de peso corporal.

TABELA DE DOSES

PESO DO ANIMAL	DOSAGEM
101 - 150 kg.....	3,0 ml
151 - 200 kg.....	4,0 ml
201 - 250 kg.....	5,0 ml
251 - 300 kg.....	6,0 ml
301 - 350 kg.....	7,0 ml
351 - 400 kg.....	8,0 ml
401 - 450 kg.....	9,0 ml
451 - 500 kg.....	10,0 ml
501 - 550 kg.....	11,0 ml
551 - 600 kg.....	12,0 ml

Obs: Os animais com peso acima daqueles relacionados deverão receber doses equivalentes a 1ml para cada 50kg de peso corporal. Recomendamos que doses superiores a 10ml sejam divididas e aplicadas em locais diferentes.

CONTRAINDICAÇÕES

ABAMECTINA 1% MATSUDA não deve ser administrada pelas vias endovenosa ou intramuscular.

O produto não deve ser utilizado nos bezerros com menos de 4 meses de vida ou 100kg de peso corporal.

Recomenda-se não aplicar o produto em animais fracos e debilitados, ou com algum tipo de comprometimento do SNC.

EFEITOS COLATERAIS

Na posologia indicada, ABAMECTINA 1% MATSUDA não apresenta efeitos colaterais. Eventualmente, podem ocorrer reações inflamatórias no local de aplicação, que desaparecem em poucas semanas, sem a necessidade de tratamento.

PERÍODO DE CARÊNCIA E RESTRIÇÃO DE USO

Não abater animais destinados ao consumo humano, antes de decorridos 35 dias do último tratamento.

O produto não deve ser utilizado nos bovinos produtores de leite, durante a fase de lactação, quando o leite for destinado ao consumo humano.

PRECAUÇÕES GERAIS

Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Lavar bem as mãos após a manipulação do produto. Obedecer às dosagens e recomendações para uso do produto. Não reutilizar as embalagens vazias. Produto tóxico para peixes. Não contaminar cursos d'água. Não jogar o frasco do produto em rios e lagos. Intoxicações e superdosagem: em casos de intoxicação por abamectina os sintomas são: depressão, tremores, ataxia, vômitos, letargia, salivação e midríase.

APRESENTAÇÃO

Frascos plásticos contendo 50ml, 250ml, 500ml e 1 litro.

MANTENHA ESTE, OU QUALQUER OUTRO MEDICAMENTO, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO. CONSERVAR O PRODUTO EM LOCAL FRESCO E SECO, AO ABRIGO DA LUZ SOLAR.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 8.837 em 13/04/2004.

Responsável Técnico: Dr^ª. Simone Florença de Moraes - CRMV-SP nº16.259.

Data do vencimento: 02 (dois) anos após data de fabricação.

Proprietário e Fabricante:

Vetecia Laboratórios de Produtos Veterinários Ltda.
Rua Dr. Alfredo Ramos, 236, Jacaré (SP) - CEP 12.308-420
CNPJ: 07.685.131/0001-07
Tel: (12) 3962-7343 - E-mail: vetecia@vetecia.ind.br

Indústria Brasileira

"Proibido o uso deste produto em bovinos de corte criados em regime de confinamentos, semi-confinamentos e em regime extensivo na fase de terminação".



REV01