

AMITRAZ CÃES



USO VETERINÁRIO - SARNICIDA
E CARRAPATICIDA PARA CÃES

DESCRIÇÃO

AMITRAZ é um composto pertencente ao grupo químico das Diamidinas, que possui efetiva ação parasiticida eficaz contra os ácaros causadores de sarnas, carrapatos e piolhos dos animais domésticos.

FÓRMULA

Cada 100 ml contém:

Amitraz.....12,5 g
Veículo q.s.p.....100,0 ml

INDICAÇÕES

AMITRAZ CÃES MATSUDA é, principalmente, indicado no tratamento das formas generalizadas da demodicose canina (*Demodex canis*), e da escabiose canina (*Sarcoptes scabiei*).

AMITRAZ CÃES MATSUDA é indicado também no controle das parasitoses externas causadas por carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*) e pulgas (*Ctenocephalides felis*), devido à capacidade de provocar o desprendimento dos carrapatos e pela sua ação repelente contra estes e as pulgas.

POSOLOGIA, VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR

A concentração do produto, bem como os intervalos entre as aplicações, ficam a critério do Médico Veterinário, na dependência do tipo de ectoparasitose, grau de comprometimento e evolução do quadro. De modo geral, a concentração recomendada de amitraz é a seguinte:

Diluir uma parte de AMITRAZ CÃES MATSUDA em 250 partes de água. Esta concentração é conseguida mediante a adição de um copo medida (2ml) para cada litro de água morna ou fria.

No tratamento da demodicose generalizada e das ectoparasitoses causadas por pulgas e carrapatos, é necessário molhar todo o corpo do animal, tendo o cuidado de não aplicar sobre os olhos e evitar a ingestão do produto pelo cão. Deixar secar, naturalmente, à sombra.

IMPORTANTE: a diluição deve ser preparada no momento do uso.

INTERVALO ENTRE AS APLICAÇÕES

Nos casos de sarna demodécica, são necessárias 3 a 8 aplicações com intervalos de duas semanas, devendo-se realizar controle por raspado de pele. Continuar o tratamento até não se encontrar ácaros no raspado após duas aplicações sucessivas ou até o final das oito aplicações. Na escabiose canina (sarna sarcóptica) recomenda-se 4 aplicações com intervalos de uma semana. Para o combate das ectoparasitoses causadas por carrapatos e pulgas, recomenda-se aplicações à intervalos de 14 dias. Geralmente o período de tratamento varia de 4 a 8 semanas e, a duração do tratamento deve ser avaliada pelo Médico Veterinário, dependendo do quadro clínico que o animal apresenta.

CONTRA-INDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO

Não utilizar para tratamento de demodicose ou escabiose localizadas. A possibilidade da ocorrência de hiperglicemia após a aplicação de amitraz, contra indica o uso do mesmo em cães com diabetes melitus, a critério do Médico Veterinário.

Não aplicar em animais debilitados, em cães com menos de 4 meses de idade e em cadelas prenhes ou em lactação ou aplicar somente sob supervisão do Médico Veterinário.

EFEITOS COLATERAIS

Podem ocorrer letargia, vômito e diarreia cerca de 24 horas após o primeiro tratamento. Podem ocorrer hiperglicemia, sedação e sonolência transitórios, particularmente em cães de raças pequenas.

PRECAUÇÕES

Recomenda-se que o aplicador utilize luvas para tratar o animal, evitando assim, o contato do produto com a pele. Não aplicar o produto sobre os olhos e evitar que o mesmo seja ingerido pelo cão. Não exercitar o animal antes da aplicação. Oferecer água fresca abundante para beber, evitando assim, que o animal fique com sede durante a aplicação do produto. Obedecer as dosagens e recomendações para uso do produto. Para evitar a reinfestação e controlar efetivamente a sarna e os carrapatos é importante tratar também o ambiente onde vivem os cães, usando produtos adequados para este fim. Não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do produto. Não utilizar e não guardar o produto, perto de bebidas, alimentos, medicamentos, produtos de higiene doméstica e do fogo. Não reutilizar a embalagem vazia. Em caso de intoxicação humana chamar imediatamente o médico. Em caso de ingestão do produto, provocar vômito administrando por via oral, uma colher de sopa de sal comum, dissolvida em um copo de água morna, pode-se incluir lavagem gástrica.

Para o Médico Veterinário: o princípio ativo AMITRAZ, quando introduzido no organismo por ingestão, exposição dérmica excessiva ou superdosagem, causa depressão do sistema nervoso central, devendo portanto, ser administrado tratamento analéptico sintomático.

APRESENTAÇÃO

Frascos contendo 20 ml, acondicionado em cartucho.

MANTENHA ESTE, OU QUALQUER OUTRO MEDICAMENTO, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO. CONSERVAR O PRODUTO EM LOCAL FRESCO E SECO, AO ABRIGO DA LUZ SOLAR.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 7.896 em 14/08/2001. Responsável Técnico: Dra. Simone Florença de Moraes - CRMV-SP nº 16.259.

Data do vencimento: 02 (dois) anos após data de fabricação.

Proprietário:

Vetecia Laboratórios de Produtos Veterinários Ltda.
Rua Dr. Alfredo Ramos, 236 - Jacareí - SP - CEP 12.308-420
CNPJ: 07.685.131/0001-07 - Tel: (12) 3962-7343
E-mail: vetecia@vetecia.ind.br

Fabricante:

Pharmalogic Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ: 05.451.258/0001-28
Avenida Lucas Nogueira Garcez, 765 - Jacareí - SP

Indústria Brasileira



CUIDADO VENENO

